

Novos registros de *Tiaris fuliginosa* (Emberizidae) no Paraguai e no sul do Brasil

Marcos Ricardo Bornschein e Bianca Luiza Reinert

Museu de História Natural "Capão da Imbuia", Rua Prof. Benedito Conceição 407, 82810-080 Curitiba, PR, Brasil

Recebido em 9 de maio de 1996; aceito em 16 de agosto de 1996

ABSTRACT. New records on the Sooty Grassquit (*Tiaris fuliginosa*) (Emberizidae) in Paraguay and Southern Brazil. We present a fourth and a fifth record of the Sooty Grassquit in Paraguay (Itabó, 25°15'S, 54°40'W, 30 November 1978, and Viveiro Florestal Itaipu, 25°27'S, 54°37'W, 30 April 1979, both in Alto Paraná Department). For Southern Brazil, we present additional records for the species in Paraná State (Refúgio Biológico de Bela Vista, 25°28'S, 54°30'W, 1991; Usina Parigot de Souza - Bairro Alto, 25°15'S, 48°45'W, 27 September 1992, and Limeira - Serra da Prata, 25°45'S, 48°45'W, 01 November 1992), and the first one for Santa Catarina State (Praia Vermelha, 26°47'S, 48°36'W, 14 November 1993), which is now the southernmost distribution limit for the species.

KEY WORDS: Geographic distribution, Paraguay, Southern Brazil, *Tiaris fuliginosa*.

PALAVRAS-CHAVE: Distribuição geográfica, Paraguai, sul do Brasil, *Tiaris fuliginosa*.

Tiaris fuliginosa é uma espécie disjuntamente distribuída na América do Sul em pequenas porções da Colômbia, Venezuela, Guiana e Brasil (Ridgely e Tudor 1989). No museu do Viveiro Florestal Itaipu (VFI), próximo a Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, Paraguai, existem dois machos desta espécie. Foram coletados

perto do rio Paraná em Itabó (25°15'S, 54°40'W), Alto Paraná, em 30 de novembro de 1978 (VFI 150) e no próprio Viveiro Florestal Itaipu (25°27'S, 54°37'W), em 30 de abril de 1979 (VFI 235). Apenas recentemente esta espécie foi assinalada para o país, com ocorrência em Lagunita - Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

(24°07'S, 55°26'W), Departamento de Canindeyú, em 12 de setembro de 1992 e em 1995 e na Estancia Nuñez (não localizado) em 1995 (Brooks 1993 in Hayes 1995, Lowen *et al.* no prelo in Barnett e Herrera 1996).

No sul do Brasil, *T. fuliginosa* conta com registros publicados para o Estado do Paraná, embora ainda não incluídos na literatura corrente sobre distribuição de aves (e.g. Sick 1985, 1993, Ridgely e Tudor 1989, Sibley e Monroe-Jr. 1990). Rodrigues *et al.* (1981) observaram esta espécie na Fazenda Monte Alegre (24°12'S, 50°33'W), município de Telêmaco Borba (sem data de registro) e Anjos e Graf (1993) na Fazenda Santa Rita (25°18'S, 49°48'W; c. 1000 m a.n.m.), município de Palmeira, em fevereiro, março, abril e julho de 1990. Estas duas localidades situam-se na região leste do Paraná. Barnett e Herrera (1996) citaram um registro efetuado por D. Finch em 22 de outubro de 1994 na Trilha das Bananeiras (c. 25°39'S, 54°27'W), no Parque Nacional do Iguaçu, município de Foz do Iguaçu, porção oeste do estado. Estes autores também mencionaram as primeiras ocorrências da espécie para a Argentina, onde foi coletada em 29 de setembro e 18 de outubro de 1994 próximo das cataratas do rio Iguaçu (c. 25°43'S, 54°27'W), no Parque Nacional Iguazú, Província de Misiones, que é vizinho do parque brasileiro mencionado acima.

No oeste do Paraná capturamos um macho em uma rede ornitológica no Refúgio Biológico de Bela Vista (25°28'S, 54°30'W), município de Foz do Iguaçu, próximo ao lago de Itaipu (rio Paraná), em 1991. No extremo leste do estado, P. Scherer-Neto capturou em rede ornitológica um casal de *T. fuliginosa* na Usina Parigot de Souza - Bairro Alto (25°15'S, 48°45'W; 100 m a.n.m.), município de Antonina, em 27 de setembro de 1992. Estes espécimes foram coletados e depositados no Museu de História Natural "Capão da Imbuia" (MHNCI), em Curitiba, Paraná (MHNCI 4203, 4204). Ainda na região oriental paranaense, observamos uma fêmea da espécie em Limeira - Serra da Prata (25°45'S, 48°45'W; 450 m a.n.m.), município de Guaratuba, em primeiro de novembro de 1992. O indivíduo deslocava-se entre as frutificações de Poaceae (Poaceae) da beira de uma estrada que cortava uma floresta primária.

Em Santa Catarina observamos *T. fuliginosa* no litoral norte do estado na Praia Vermelha (26°47'S, 48°36'W; 50 m a.n.m.), município de Penha, em 14 de novembro de 1993. Na ocasião vimos alguns indivíduos alimentando-se nas frutificações de Poaceae, juntamente com *Volatinia jacarina* e *Haplospiza unicolor*.

Aparentemente os registros para o sul do Brasil citados acima são os únicos conhecidos na região, sendo que o de Santa Catarina representa o limite austral da distribuição geográfica da espécie.

Devido a escassez de informações sobre *T. fuliginosa* nos seus limites meridionais de ocorrência, não é possível

assegurar se este pássaro é residente, sazonal ou de aparição ocasional na região envolvida. Neste sentido, Barnett e Herrera (1996) cogitaram a possibilidade da espécie estar expandindo a sua distribuição para sul, em função dos recentes registros no Paraná (Brasil), Paraguai e Argentina. Cumpre notar ainda, que a identificação de *T. fuliginosa* em campo e mesmo com espécimes em museu é problemática e requer atenção especial, dada a semelhança plumária com outros Emberizidae (veja Sick 1985).

AGRADECIMENTOS

Júlio de Moura Leite, Jorge B. Nacinovic, Dante M. Teixeira e André A. R. de Meijer leram criticamente uma versão anterior deste manuscrito. Sandra B. Mikich e Beatriz B. Alves de Souza revisaram o resumo. Nelson Pérez e Andrés Colmán prestaram auxílio junto ao museu do VFI e Pedro Scherer-Neto junto ao MHNCI. Mauro Pichorim compartilhou a observação de *T. fuliginosa* efetuada na Serra da Prata, local onde os trabalhos de campo foram coordenados por Fernando C. Straube. Celso Seger, Aderlene Lara, Sérgio D. Arruda, Roberto Bóçon e Roberto Antonelli-Filho compartilharam o registro da espécie realizado junto ao lago de Itaipu. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) apoiou parte de nossas pesquisas.

REFERÊNCIAS

- Anjos, L. dos e V. Graf (1993) Riqueza de aves da Fazenda Santa Rita, região dos Campos Gerais, Palmeira, Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 10(4):673-693.
- Barnett, J. M. e J. Herrera (1996) Primer registro de *Tiaris fuliginosa* (Wied, 1830) para la Argentina. *Hornero* 14(3):73-74.
- Hayes, F. E. (1995) *Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay*. Monographs in Field Ornithology, Lomalinda, n. 1.
- Ridgely, R. S. e G. Tudor (1989) *The birds of South America*. Vol. I: *The Oscine passerines*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Rodrigues, L. C., A. F. de Almeida, P. Kikuti e R. M. Speltz (1981) Estudo comparativo da avifauna em mata natural e em plantio homogêneo de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze. *IPEC, Circular Técnica* 132:1-7.
- Sibley, C. G. e B. L. Monroe-Jr. (1990) *Distribution and taxonomy of birds of the world*. v. II. New Haven: Yale Univ. Press.
- Sick, H. (1985) *Ornitologia brasileira: uma introdução*, v. II. Brasília: Ed. Univ. Brasília.
- _____ (1993) *Birds in Brazil: a natural history*. Princeton: Princeton Univ. Press.