

Novo registro estende a distribuição conhecida de *Arremon franciscanus* (Passeriformes: Emberizidae) ao sul

Santos D'Angelo Neto¹ e Marcelo Ferreira de Vasconcelos^{1,2}

¹Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Montes Claros, Avenida Dr. Rui Braga, s/nº, 39401-089 Montes Claros, MG, Brasil. ²E-mail: bacurau.salsa@bol.com.br

Recebido em 19 de setembro de 2002; aceito em 7 de julho de 2003.

ABSTRACT. New record extends the known range of *Arremon franciscanus* (Passeriformes: Emberizidae) southward. We report a new record for *Arremon franciscanus* in an area of arboreal caatinga at the Imburana Ranch (16°22'56"S, 43°24'37"W), in the municipality of Francisco Sá, in the state of Minas Gerais, Brazil. One individual was tape-recorded and collected. The specimen is deposited in the Ornithological Collection (*Coleção Ornitológica*) of the Department of Zoology of the Federal University of Minas Gerais (*Universidade Federal de Minas Gerais*) under the record number DZUFMG 3382. This record extends the known range of this species 110 km southward. **KEY WORDS:** Brazil, caatinga, Emberizidae, geographic distribution.

PALAVRAS-CHAVE: Brasil, caatinga, distribuição geográfica, Emberizidae.

Arremon franciscanus Raposo, 1997 é uma espécie descrita recentemente com base em quatro espécimes provenientes de Mocambinho (15°05'S, 44°00'W), norte de Minas Gerais, e de um único exemplar de Cândido Sales (15°30'S, 41°15'W), Bahia, Brasil (Raposo 1997). Registros posteriores de *A. franciscanus* foram realizados em Palmeiras (12°31'S, 41°33'W), Bahia (Parrini *et al.* 1999, CBRO 2000), Mocambinho (15°03'S, 44°02'W), próximo à localidade-tipo, (Kirwan *et al.* 2001), no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (15°09'S, 44°15'W), Minas Gerais (Kirwan *et al.* 2001), e ao norte de Montalvânia, Minas Gerais (Barnett e Kirwan 2002). Uma vez que são conhecidos poucos registros de *A. franciscanus*, o objetivo desta nota é relatar uma nova localidade para a espécie, expandindo sua área de distribuição ao sul.

No dia 31 de março de 2002, um indivíduo de *A. franciscanus* foi observado em uma área de caatinga arbórea na Fazenda Imburana (16°22'56"S, 43°24'37"W), município de Francisco Sá, Minas Gerais. Esta ave teve sua vocalização gravada e foi coletada, sendo o espécime tombado na Coleção Ornitológica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob o número DZUFMG 3382. Uma cópia da gravação foi depositada no Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho (ASEC), Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Este registro estende a distribuição de *A. franciscanus* cerca de 110 km para o sul de sua área de distribuição geográfica anteriormente conhecida. Além disso, esta localidade encontra-se a cerca de 1 km do topo da Chapada do Catuni, um setor da Cadeia do Espinhaço que representa o divisor de

águas entre as bacias dos rios São Francisco e Jequitinhonha. Desta forma, recomendamos a busca por esta espécie em áreas propícias à sua ocorrência na bacia do Rio Jequitinhonha, uma vez que existem registros de *A. franciscanus* a leste do Espinhaço nas localidades de Cândido Sales, bacia do Rio Pardo (Raposo 1997) e Palmeiras, bacia do Rio Paraguaçu, ambas no estado da Bahia (Parrini *et al.* 1999, CBRO 2000).

AGRADECIMENTOS

Somos gratos às Pró-Reitorias de Pesquisa e de Ensino da Universidade Estadual de Montes Claros pelo apoio em nosso estudo sobre a avifauna do norte de Minas Gerais. G. A. S. V. D'Angelo e J. Gomes Neto auxiliaram em nossos trabalhos de campo.

REFERÊNCIAS

- Barnett, J. M. e G. M. Kirwan (2002) Neotropical notebook. *Cotinga* 18:102-113.
- CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2000) Resolução N° 3 – Incluir *Arremon franciscanus* Raposo, 1997 na lista principal de aves brasileiras, na categoria de residente #, inserindo-o imediatamente após *Arremon taciturnus* (Hermann, 1783). *Nattereria* 1:38.
- Kirwan, G. M., J. M. Barnett e J. C. Minns (2001) Significant ornithological observations from the Rio São Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil, with notes on conservation and biogeography. *Ararajuba* 9:145-161.
- Parrini, R., M. A. Raposo, J. F. Pacheco, A. M. P. Carvalhães, T. A. Melo Júnior, P. S. M. Fonseca e J. C. Minns (1999) Birds of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. *Cotinga* 11:86-95.
- Raposo, M. A. (1997) A new species of *Arremon* (Passeriformes: Emberizidae) from Brazil. *Ararajuba* 5:3-9.

BRANCA